BULLETIN

DE LA

SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIQUE

DE FRANCE

FONDÉE LE 29 FÉVRIER 1832

RECONNUE COMME INSTITUTION D'UTILITÉ PUBLIQUE

Natura maxime miranda in minimis.



PARIS

AU SIÈGE DE LA SOCIÉTÉ

HOTEL DES SOCIÉTÉS SAVANTES

28, Rue Serpente, VI°

1918

Le Bulletin paraît deux fois par mois.

Librairie de la Société entomologique de France

Hôtel des Sociétés savantes, rue Serpente, 28

La Société dispose des ouvrages suivants :

(Le premier prix est pour les **membres** de la Société, le deuxième, pour les personnes étrangères à la Société.)

Annales de la Société entomologique de France, années	
1843 à 1845, 1859 à 1870, 1872 à 1879 et 1883 à	
1895. Annales (années 1896 à 1917) Tables des Annales (1832-1860), par AS. Paris	12 et 15 fr.
Annales (années 1896 à 1917)	25 et 30 fr.
Tables des Annales (1832-1860), par AS. PARIS.	2 et 3 fr.
Tables des Annales, de 1861 d 1880, par E. LEFEVRE.	10 et 12 fr.
	,50 et 10 fr.
Bulletin de la Société entomologique de France	
(publication distincte des Annales, depuis 1896),	
années 1896 à 1917, chaque année	18 fr.
Bulletin (numéros isolés), chaque	1 et 1 fr.
Bulletin, comptes rendus du Congrès (1 ou plus. Nos).	5 et 5 fr.
L'Abeille (série in-12), la plupart des volumes, chacun.	8 et 12 fr.
L'Abeille (série in-8°), 1892-1906, prix de l'abonnement	
par volume (port compris)	10 et 12 fr.
par volume (port compris)	
Vol. I (Carnivora, Palpicornia)	(Épuisé).
Vol. II (Staphylinoidea, 1re part.) (par J. Ste-CLAIRE	
DEVILLE)	3 et 4 fr.
DEVILLE)	4 et 5 fr.
Vol. V (Phytophaga)	8 et 10 fr.
1° lascicule seul.	3 et 4 fr.
2º fascicule seul	5 et 6 fr.
Vol. VI (Rhynchophora)	(Épuisé)
2º fascicule seul	5 et 6 fr.
2º fascicule seul	
l'Afrique, par L. Bedel, 1er fasc., pp. 4-208, in-8°.	
1895-1900	10 et 12 fr.
1895-1900	
ptères), par A. GROUVELLE, fasc. 1 (1916), pp. 1-80.	3 et 4 fr.
Synopsis des Onthophagides d'Afrique, par H. D'ORBIGNY.	90 0+ 92 6
Les zoocécidies du Nord de l'Afrique, par C. Houard	8 et 10 fr.
Des 200ccentes au nora de l'Afrique, par G. Houard.	o et 10 ir.
EVERAIDE DE MADRICE	
EXTRAITS DE L'ABEILLE	
Catalogue syn. et géogr. des Coléoptères de l'Anc Monde,	
par S. de Marseul, 1889, in-12	3 et 4 fr.
Catalogus Coleopterorum Europae et confinium, 1866, in-12.	0 fr. 50
Id. avec Index (Suppl. au Catalogus), 1877, in-12.	1 fr. 25
Les Entomologistes et leurs écrits, par de Marseul, in-12	8 et 10 fr.
Etude sur les Malachides d'Europe et du bassin de la Mé-	0 00 10 11.
ditamanda non Druman 1977 in 19	
atterrance, par PEIRON, 1077, III-12.	4 et 5 fr
diterrance, par Peyron, 4877, in-42. Mylabrides d'Europe (Monogr. des), par S. DE MARSEUL.	4 et 5 fr.
Mylabrides d'Europe (Monogr. des), par S. DE MARSEUL.	4 et 5 fr.
Mylabrides d'Europe (Monogr. des), par S. DE MARSEUL, 1870, in-12, 2 planches coloriées : 5 et 6 fr.; noires :	4 et 5 fr.

Librairie de la Société entomologique de France (suite).

Silphides (Précis des genres et espèces des), par S. de Mar- SEUL, 1884, in-12.	3 et 4 fr.
Tableaux synoptiques des Paussides, Clavigérides, Psela- phides et Scydmenides, par Reffer (trad. E. Leprieur).	
1883, in-12.	3 et 4 fr.
Nouveau Répertoire contenant les descriptions des espèces de l'Ancien Monde, par S. de Marseul:	
Hydrocanthares Palpicornes, 1882, in-12 Buprestides, 1889, in-12	3 et 4 fr. 1 et 2 fr.
Oedémerides (Synopse des), par Ganglbauer (traduction de	
Marseul), 1887, in-12	1 et 2 fr.
Ditomides (Monogr. des), par P. DELA BRULERIE, 1873, in-12.	2 et 3 fr.
Eumolpides (Synopse des), par E. Lefèvre (Appendice par DE MARSEUL), 1876, in-12	1 et 2 fr.
Historides de l'Archipel malais et indo-chinois, par S. DE	
Marskul, 98 p., 1864, in-12	1 fr.
Magdalinus d'Europe et circa, par Desbrochers des Loges, 1870, in-12.	1 50 et 2 fr.
Nanophyes (Monogr. du genre), par H. Brisout de Barneville, 1869, in-12	1 50 et 2 fr.
Erotylideset Endomychides de l'Ancien Monde (Revision des), d'après les travaux de M. E. Reitter, 1889, in-12	1 50 et 2 fr.
Glaphyrus (Monogr. du genre), par Harold (traduction A. Preud'homme de Borre), 1870, in-12	0 fr. 50
Oxyporus (Tableau synopt. du genre), par A. FAUVEL,	11.00
1864, in-12	0 fr. 50
Malthinides de l'Ancien Monde (Monogr. des), par S. DE MARSEUL, 120 p., 1877, in-12	3 et 4 fr.
Trichopterygiens (Synopse des espèces de), par MATTHEWS, 75 p., 1878, in-12	3 et 4 fr.
Apionides (Monographie des), par Wencker, 162 p., 1864,	0 00 4 11.
in-12	4 et 5 fr.
Telephorides (Monographie des), par S. DE MARSEUL, 108 p., 1864, in 12	3 et 4 tr.

EXTRAITS ET PUBLICATIONS DIVERSES

Revision des Coléoptères de l'Ancien Monde alliés aux	
Stenosis, par Ed. Reitter, in-12, 50 p. (Extr. Gazette	4 40 . 0 .
ent. Allem., XXX, 1866)	1 50 et 2 ir.
Le genre Aëpophilus, par V. Signoret, in-8°, 3 p., 1 pl.	
col. (Extr. Tijdsehr. voor. Ent., vol. XXIII, 1879-80).	1 et 1 50
[Voir la suite à la page 6 de l	a couverture]

AVIS TRÈS IMPORTANTS

Annales. - Les 2e et 3e trimestres des Annales de 1917 ont

paru le 8 février 1918.

Le Trésorier rappelle que les *Annales* ne seront envoyées qu'aux membres de la Société qui auront payé la cotisation de l'année. Il prie donc ses collègues de se mettre en règle le plus tôt possible, en lui faisant parvenir leur cotisation.

Il est à leur disposition pour la recevoir tous les jours de semaine de 10 h. à midi, 17, quai Voltaire, Paris, VII^e, et à toutes les séances

de la Société, 28, rue Serpente.

Tous les envois d'argent faits à la Société (par lettres chargées, mandats-poste ou chèques payables à Paris) doivent être libelles au nom de M. Ch. Lahaussois, Trésorier, et non autrement, pour éviter les difficultés d'encaissement d'envois impersonnels.

Les envois peuvent lui être faits soit à son domicile, 2, rue de La Planche, Paris, VIIe, soit au siège de la Société, 28, rue Serpente.

L'Abeille. - Le 4º fascicule du vol. XXXI a paru le 22 avril 1914.

Avis. — La Bibliothèque de la Société est ouverte : pour renseignements, tous les jours, de 4 h. 1/2 à 6 h. 1/2; — pour y travailler : les mardis, jeudis, samedis, de 3 h. à 6 h. 1/2.

G. Melou, instituteur à Mananjary (Madagascar), vient de faire paraître une brochure: « Dix ans de chasses entomologiques aux colonies. — Industrialisation de la chasse aux Hétérocères (170.000 papillons en huit mois) ».

Il se fera un plaisir d'en adresser un exemplaire aux membres

de la Société enfomologique qui le désireront.

Dans cette brochure, il dit comment on peut prendre un nombre quelconque d'Hétérocères en un temps déterminé, très court.

Il parle des progrès rapides que pourrait faire l'étude de l'Entomologie si elle ne dépendait pas aussi étroitement du commerce dont elle est l'objet.

Il indique comment on pourrait faire progresser cette science et

toute l'histoire naturelle.

Et il ouvre la discussion à ce sujet, priant les lecteurs de vouloir bien lui permettre de publier leurs réponses dans une seconde et prochaîne édition.

PRÉPARATION D'INSECTES DE TOUS ORDRES

Étalage soigné de Lépidoptères, etc. — Entretien de collections et soufflage de chenilles. — Préparations microscopiques.

M¹¹° C. Bleuse, 29, rue Lacépède, Paris (Ve_/.

Envoi du tarif sur demande.

BULLETIN

DE LA

SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIQUE DE FRANCE

Séance du 24 juillet 1918.

Présidence de M. J. DE JOANNIS, ancien Président.

Changement d'adresse. — M. le Dr P. MARCHAL, 45, rue de Verrières, Antony (Seine).

Présentation. — M. le capitaine J. Dubreton, commt la 22° S. M. A. 242° régiment d'artillerie, présenté par M. J. Magnin. — Commissaires-rapporteurs : MM. A. Honoré et R. Peschet.

Communications.

Notes sur la synonymie de plusieurs Araignées de la famille des *Clubionidae*

par E. Simon.

- I. Clubiona virescens Sundevall me paraît ne pouvoir être que Chiracanthium nutrix Westring (non Walckenaer) pour lequel j'avais proposé le nom de C. lapidicolens adopté par Kulczynski. Il devra s'appeler Chiracanthium virescens Sund.
- II. Je suis arrivé à la conclusion que Chiracanthium erroneum Cambr., E. Simon (Clubiona nutrix Bl.) n'est que le grand développement de C. erraticum Walckenaer; la présence de petites épines fémorales tient à ce développement; l'absence de longs poils dressés au tibia de la patte-mâchoire, indiquée par O. P. CAMBRIDGE, est sans doute accidentelle, ces poils tombant facilement.
- III. Clubiona Canestrinii G. Castelli, in Atti Soc. Venet. tr. S. N., ser. 2, I, p. 9, ff. 1-2 (1892), est à ajouter à la synonymie de Bull. Soc. ent. Fr. [1918]. N° 14.

C. similis L. Koch. A l'époque où l'auteur m'avait consulté au sujet de cette espèce, je confondais C. neglecta Cb. et C. similis L. K. et je l'avais comparée à un mâle typique du premier.

IV. — Clubiona vegeta, nov. nom. — Nom nouveau proposé pour C. parvula Lucas, préoccupé par C. parvula Blackwall, synonyme de Dictyna arundinacea. — L. Koch avait répandu l'espèce sous le nom inédit de C. vegeta que je conserve.

V. — Clubiona stigmatica E. Simon est synonyme de C. genevensis L. Koch, 1867, et devra prendre ce nom. Plusieurs auteurs ont parlé de cette espèce sous le nom de C. decora Blackwall par confusion avec le vrai C. decora Bl., de Madère.

VI. — Agraeca Haglundi Thorell, E. Simon, etc., est le vrai A. brunnea Bl. — L'espèce que, d'après Thorell, j'ai décrite sous le nom d'A. brunnea, doit s'appeler A. Iusatica L. Koch, 1874.

VII. — Agraeca inopina O.P. Cambridge (in Pr. Dorset Cl., [1886], p. 2, tab. 4, fig. 4), que je confondais autrefois avec A. proxima Cambr., est assez répandu en France.

VIII. — Agraeca chrysea L. Koch est synonyme d'A. pullata Thorell et devra en prendre le nom.

IX. — Aranea relucens Latr., souvent cité en synonymie de Micaria fulgens Walckenaer, n'y correspond que pour une partie, car la description de Latreille montre que plusieurs espèces ont été confondues par lui, particulièrement M. pulicaria Sund. — Cette description ne date que de 1804 et du tome VII de l'« Histoire naturelle des Crustacés et des Insectes» (dans son « Genera», Latreille renvoie bien à son « Histoire des Fourmis » (1802), mais dans ce dernier ouvrage Aranea relucens est cité sans description).

Abondance exceptionnelle de la chenille d'Hybernia defoliaria Hb. [Lep. Geometridae]

par J. DE JOANNIS.

Dans le Bulletin Soc. ent. Fr. [1917], p. 242, j'ai signalé la capture, d'une précocité anormale, que M. J. Auneau a faite l'an dernier du papillon Hybernia defoliaria Hb. au Bois de Boulogne.

Comme suite à ces observations, M. J. Auneau m'a signalé récemment l'excessive abondance de la chenille de cette espèce au même

lieu. Il peut être utile de noter ces apparitions exceptionnellement nombreuses d'espèces qui peuvent devenir gravement nuisibles. Je consignerai donc ici quelques-uns des faits que M. J. Auneau a portés à ma connaissance les 21 et 24 mai derniers : « Je suis allé hier au Bois de Boulogne et j'ai compris pourquoi cette espèce malfaisante avait été si bien dénommée defoliaria : chênes, hêtres, bouleaux, aubépines, n'ont plus une feuille. J'ai vu dans une allée située entre le rond-point des Mélèzes et l'allée de la Reine-Marguerite un marronnier de 0^m,30 de diamètre couvert de chenilles sur une hauteur de 4 à 5 mètres depuis le sol; à terre, les bestioles formaient un tapis de 0m.60 de large; un piquet voisin supportant le fil de fer de bordure disparaissait sous les corps des Hybernia; dans une allée parallèle, à droite de celle-ci et immédiatement voisine, du côté de la Croix-Rouge néerlandaise, même phénomène sur un hêtre; d'autres arbres, pour être moins garnis, avaient cependant une quantité formidable de ces bêtes dévorantes. Les seuls Calosomes ont l'air de vouloir les détruire, mais ils sont bien peu nombreux » (21 mai 1918).

Sur ma demande, M. J. Auneau m'envoya un petit lot de ces chenilles, dont je désirais vérifier l'identité; sur une trentaine que je reçus, une seule appartenait à une autre espèce. M. Auneau me disait, en me faisant cet envoi, que le nombre des ennemis des chenilles avait augmenté, notamment le Calosoma inquisitor L. et le Silpha quadripunctata Schreber. J'ai constaté également que nombre de chenilles reçues portaient extérieurement des petits œufs blancs de quelque parasite; ces œufs étaient en général placés sur le premier anneau, derrière la nuque. Il est possible que l'an prochain le jeu connu du parasitisme réduise cette espèce nuisible à des proportions normales.

Observations sur Zygaena (Anthrocera) Minos Boisd.
et Zygaena (Anthrocera) erythrus Hb. [Lep. Zygaenidae]
par Enrico Ragusa.

Ayant recueilli en Sicile, en mai 1918 aux environs de Palerme et à la fin juin à Inistretta, la chenille de Zygaena Minos Boisd., je crois intéressant de faire remarquer que cette chenille suffit à démontrer que Zygaena Minos Boisd. est une espèce très distincte de Zygaena erythrus Hb. avec lequel on l'avait mise en synonymie.

Boisduval, qui a décrit et si bien figuré Zygaena Minos de Sicile (1), a donné la description de la chenille de Zygaena erythrus Hb. comme étant celle de Z. Minos.

MILLIÈRE (2) émet à ce propos l'opinion qu'il a dû y avoir confusion entre les deux chenilles de Z. erythrus Hb. et Z. pilosellae Esp., et en effet la description qu'il donne de la chenille de Z. erythrus Hb. est la même que celle donnée par Boisduval pour la chenille de Z. Minos.

Boisduval, Millière, Mann (3), Seitz (4) et Spuler (5) ont tous décrit la chenille de Z. erythrus Hb. comme « pubescente, d'un jaune pâle et quelquefois verdâtre, avec, sur chaque côté, deux rangées de douze taches noires, etc. ». La chenille de Z. Minos est bien différente : elle est toute noire, pubescente, avec de chaque côté une rangée latérale de huit perles ovales d'un jaune citron, surmontées d'un point noir velouté; la tête est noire, avec un léger collier jaunâtre.

La transformation a lieu dans une coque fusiforme, parcheminée, jaunâtre et luisante.

Boisduval, qui avait vu un très grand nombre d'exemplaires de Z. Minos pris en Sicile par Alexandre Lefebyre, dit qu'ils sont généralement plus grands que ceux des autres parties de l'Europe et que les Q sont beaucoup plus jaunâtres; Seitz $(l.\ c.)$ l'a nommé magna d'après Staudinger qui avait mis en vente sous ce nom des spécimens provenant des Abruzzes. Verity $(^6)$ en a fait une variété de Z. erythrus (var. albipes).

Je possède aussi de Sicile Z. erythrus, que A. Lefebyre avait déjà signalé à Boisduyal comme pris par lui en Sicile. Il est bien plus petit, plus rare et plus précoce que Z. Minos.

(1) Monogr. Zygæn., p. 31, tab. 1, fig. 7.

⁽²⁾ Icon., III, p. 65, tab. 107, fig. 9-11 (erythrus) et fig. 12 (Minos = pilosellae).

⁽³⁾ Verzeichniss der im Jahre 1858 in Sicil. gesamm. Schmett., Wien. ent. Monatschr., III [1859], p. 92.

⁽⁴⁾ Die Grossschmett. der Erde, Spinner und Schwärmer, II, p. 18.

⁽⁵⁾ Die Raupen der Schmett. Europas, tab. 9, fig. 18.

⁽⁶⁾ Bull. Soc. ent. Fr. [1916], p. 289.

VOYAGE DE CH. ALLUAUD ET R. JEANNEL en Afrique Orientale (1911-1912)

Mémoires parus :

Liste des Stations: par Ch. Alluaud et R. Jeannel, avec une carte. Grottes de l'Afrique Orientale: par Ch. Alluaud et R. Jeannel.

Crustacés : I, Phyllopoda, par E. Daday de Deés. — II, Amphipoda, par E. Chevreux.

Arachnides: I, Opiliones, par le Dr C.-Fr. Roewer, avec 1 pl. n. — II, Ixodidae, par L.-G. Neumann. — III, Araneae (1re partie), par L. Berland.

Hémiptères: I, Pentatomidae, par le Dr R. Jeannel, avec 4 pl. n. — II, Naucoridae, Belostomidae et Nepidae, par A.-L. Montandon.

Strepsiptères: par le Dr R. JEANNEL, avec 1 pl. n.

Coléoptères: I, Pselaphidae, par A. Raffray. — II, Onthophagini, par H. D'Orbigny. — III, Meloidae, par M. Pic, avec 1 pl. col. — IV, Hylophilidae et Anthicidae, par M. Pic, avec 1 pl. n. — V, Hybosorinae, etc., par E. Benderitter, avec 1 pl. n. — VI, Buprestidae, par Ch. Kerremans, avec 1 pl. col. — VII, Lampyridae, par E. Olivier. — VIII, Hispinae, par R. Gestro, avec 1 pl. n. — IX, Dascillidae, etc., par M. Pic. — X, Anthribidae, par K. Jordan. — XI, Histeridae, par H. Desbordes. — XII, Dynastinae, par E. Benderitter, avec 1 pl. n.

Hyménoptères: I. Proctotrupidae, Cynipidae; etc., par J.-J. Kieffer. — II, Formicidae, par le D^r F. Santschi, avec 2 pl. n. — III, Chrysididae et Vespidae, par R. du Buysson. — IV, Braco-

nidae, par Gy. Szépligeti.

Diptères: I, Chironomidae et Cecidomyidae, par J.-J. Kieffer. — II, Nematocera, par F.-W. Edwards. — III, Polyneura, par P. Riedel. — IV, Anthomyiidae, par P. Stein. — V, Brachycera, par Th. Becker, avec 2 pl. n.

Lépidoptères: I, Chenilles des galles, par F. Le Cerf, avec 2 pl. n. Orthoptères: I, Dermaptera, par A. Borelli, avec 2 pl. n. — II,

Mantidae, par L. CHOPARD.

Pseudonévroptères: I, Termitidae, par V. Sjöstedt. — II, Odonata, par R. Martin, avec 3 pl. n.

Névroptères: Planipennia, etc., par L. Navás.

Myriapodes: I, Chilopoda, par H. RIBAUT, avec 5 pl. n. — II, Symphyla, par H. RIBAUT, avec 2 pl. n.

Plancton du Victoria-Nyanza, par J. VIRIEUX, avec 2 pl. n.

Vers: Turbellaries, Trematodes et Gordiaces, par P. DE BEAUCHAMP, avec 1 pl. n. — II, Oligochètes, par Michaelsen, avec 1 pl. n.

Poissons du Victoria-Nyanza, par le Dr J. Pellegrin, avec 1 pl. n.

La publication est en dépôt à la Librairie des Sciences naturelles Léon LHOMME, 3, rue Corneille, Paris (VI*).

Librairie de la Société entomologique de France (suite). Characters of undescribed Lepidopteru heterocera, par 3 et 4 fr. F. WALKER, London, 1869, in-8°...... Tableaux analytiques pour déterminer les Coléoptères d'Europe, in-8c, Moulins. (Extr. Rev. sc. Bourb.) : I. Nécrophages, traduit de Reitter [par M.-J. 4 fr. 0 fr. 50 Histérides nouveaux (Description d'), par S. DE MARSEUL, in-8° (Extr. Ann. Soc. ent. Belg.). 1 50 et 2 fr. Monographie de la famille des Eucnémides, par H. DE BONVOULOIR, Paris, Soc. ent. Fr., in-8° avec 42 plan-5 et 7 fr. Essai sur la classification des Pyralites, par E.-L. RAGO-NOT, in-8°, 276 p., 4 pl. color. (Extr. Ann. Soc. ent. 40 et 42 fr. 4 et 6 fr. Nouveaux genres et espèces de Phycitinae et Galleriidae. par E.-L. RAGONOT, in-8°, 52 p. (Extr. Ann. Soc. ent. Fr. 1888)............. 3 et 4 fr. Notes sunonumiques sur les Microlepidoptères et description d'espèces peu connues ou inédites, par E. L. RAgonor, in-8°, 66 p., 1 pl. color. (Extr. Ann. Soc. ent. 4 et 5 fr. Microlépidoptères de la Haute Syrie récoltés par M. Ch. Delagrange, par E.-L. RAGONOT, in-8°, 15 p. (Extr. Diagnoses of North American Phycitidae and Galleriidae. by E.-L. RAGONOT, Paris, 1887, in-8°, 20 p. 1 50 et 2 fr. Revision of British species of Phycitidae and Galleriidae, by E.-L. RAGONOT, in-8°, 58 p. 2 fr. et 2 50 Catalogue des Phycitinae, par E.-L. RAGONOT, in-4°, 52 p. (Extr. de la Monogr. des Phycitinae, 1893) S. l. n. d. 5 et 6 fr. Genera et Catalogue des Psélaphides, par A. RAFFRAY, in-80,621 p., 3 pl. (Extr. des Ann. Soc. ent. Fr., 1903). 20 et 25 fr.

Pour les Membres de la Société, les offres d'échanges, demandes de communications ou de renseignements d'ordre purement scientifique, qui n'excéderont pas cinq lignes, seront insérées gratuitement dans deux numéros; lorsque ces offres ou demandes n'excéderont pas dix lignes, elles couteront 0 fr. 20 la ligne pour deux numéros.

La Société entomologique de France tient ses séances les 2º et 4º mercredis de chaque mois (excepté août et septembre), à 8 h. 1/2 du soir, au siège social, Hôtel des Sociétés savantes, 28, rue Serpente.

Elle publie :

1º Les Annales de la Société entomologique de France (4 fascicules par an avec planches et figures);

2º Le Bulletin de la Société entomologique de France (21 numéros par

an avec figures).

Les Membres résidant en France, dans les pays de protectorat ou les colonies françaises, paient une cotisation annuelle de. 25 fr.

Tout Membre payant une somme de 300 francs est nommé Membre à vie. Il n'a plus de cotisation à payer, reçoit franco les Annales, le Bulletin, et, à titre de prime gratuite, une série de dix volumes des Annales parmi ceux à prix réduit restant encore en magasin.

Ce versement de 300 francs peut s'effectuer par fractions annuelles et con-

sécutives d'au moins 100 francs.

La Bibliothèque (28, rue Serpente) est ouverte aux Sociétaires les mardis, jeudis et samedis, de 3 heures à 6 heures 1/2; le mercredi, de 8 à 10 heures 1/2 du soir.

PROPRIÉTÉS DE LA SOCIÉTÉ

L'ABEILLE, Journal d'Entomologie, fondé par S. DE MARSEUL. continué par la Société entomologique de France, publie spécialement des travaux sur les Coléoptères de l'Ancien Monde.

M. L. BEDEL, 20, rue de l'Odéon, est chargé de la publication du Journal (examen et admission des mémoires et correspondance scien-

tifique).

Le montant des abonnements L'Abeille (à 10 fr. ou 12 fr. par volume) doit être adressé à M. J. MAGNIN, Bibliothécaire adjoint de la Société entomologique, 28, rue Serpente.

COLLECTIONS

Collection H. Sénac (Tenebrionidae paléarctiques), Collection Ch. Brisout de Barneville (Coléoptères paléarctiques), Collection Vauloger (Anthicidae, Malachiidae, Erodiidae), chez M. L. BEDEL, 20, rue de l'Odéon;

Collection H. de Peyerimhoff (Microlépidoptères),

Collection H. Brisout de Barneville (Coléoptères d'Europe),

Collection A. Brisont de Barneville (Coteopteres à Europe),
Collection Aubé (Coléopteres paléarctiques),
Collection Capiomont (Hyperidae, Lixus, Larinus),
Collection Vauloger (Helopidae).
Collection complète des Orthoptères de France, don Finot,
Collection d'Hémiptères de France, don Fairmaire,
Collection Pandellé (Diptères de France),
Collection de Diptères de France, don de M. le D'Gobert,
Collection A. Cheux (Lépidoptères de France),
Collection entervalogique francaise de tous les ordres

Collection entomologique française de tous les ordres.

Collection d'exemplaires typiques,

au Siège social, 28, rue Serpente.

SOMMAIRE DU Nº 14

Séance du 24 juillet 1918

Changement d'adresse. — Présentation	201
Communications	
E. Simon. — Notes sur la synonymie de plusieurs Araignées de la famille des Clubionidae.	201
J. DE JOANNIS. — Abondance exceptionnelle de la chenille d'Hybernia defoliaria Hb. [Lep. Geometridae]	202
Enrico Ragusa. — Observations sur Zygaena (Anthrocera). Minos Boisd. et Zygaena (Anthrocera) erythrus Hb. [Lep. ZYGAENIDAE]	203

Pour la correspondance scientifique, les réclamations et les annonces s'adresser à :

M. le Secrétaire de la Société entomologique de France

28, rue Serpente, Paris, 6°.